

## Tubos De la Ventilación: Cuidado Casero


### Qué a esperar

1. Un paciente debe tener poco o nada de dolor de este procedimiento. Si hay dolor, va generalmente lejos en el plazo de 30 minutos. Con los niños el dolor se puede controlar por Tylenol líquido (acetaminophen) cada 4 a 6 horas según lo necesitado.

Edad	Dosificación	Edad	Dosificación
4-11 meses	½ cucharilla	2-3 years	1 cucharilla
12-23 meses	¾ cucharilla	4-5 years	1 ½ cucharillas

Si su niño está vomitando, substituya un suppository.

2. Si ocurre la náusea o el vomitar, debe conseguir mejor dentro de algunas horas. Llame la oficina si continúa.
3. Limite la actividad por algunas horas después del procedimiento. La mayoría de los niños vuelven al comportamiento normal dentro de un período del tiempo muy corto. Los niños pueden volver a la guardería o enseñar el día siguiente y pueden reasumir todas las actividades. El juego vigoroso no aflojará los tubos del oído. El recorrido, incluyendo en aeroplano, se permite.
4. Si hay una bola del algodón en el oído, esto se puede quitar en el cuarto de la recuperación. La sangría leve de los oídos puede ocurrir en el día de la cirugía. Si está necesitado, coloque otra bola del algodón.
5. Comience a alimentar líquidos claros. Si se toleran bien, entonces ofrezca una comida ligera.
6. Solamente bajo ciertas circunstancias quiera a su doctor prescriben gotas del oído. Deben ser colocadas en el canal de oído con su niño que se acuesta con un oído al techo. Aplique el número prescrito de gotas. Puede ayudar a tirar del oído externo para enderezar el canal de oído o para bombear el pedazo pequeño de cartilago llamado el tragus. Si su niño es cooperativo, tenga lo o su mentira en su lado por 5-10 minutos. Un pedazo pequeño de algodón, aplicado en el tazón de fuente del oído, ayudará a absorber la solución cuando funciona hacia fuera el canal. El algodón no tiene que permanecer en el lugar para de largo.
7. La recomendación más actual es que los enchufes del oído no deben ser necesarios durante la rutina que se baña y que nada. Es solamente cuando un niño llega a ser bastante viejo para zambullirse o para sumergir su cabeza más de 12 pulgadas debajo del agua que un enchufe del oído es necesario. Los enchufes modificados para requisitos particulares del oído se pueden comprar en su oficina de los doctor. Para evitar los auriculares que caen hacia fuera, recomendamos el usar de un casquillo de la natación o de una venda de la cabeza del neopreno (disponible en su oficina o farmacia de los doctor.)
8. Llame su oficina de los doctor si hay alguna descarga del oído después del primer día (puede ser que sea una muestra de la infección), del dolor que dura más de un día, de la fiebre o de vomitar persistente.
9. Si su niño tenía una adenoidectomía (algún tejido fino quitado de la parte posteriora de la nariz), usted puede contar con 1.) una cantidad ligera de sangre en la nariz de su niño o garganta y 2.) un cierto malestar suave



Tylenol (acetaminophen) debe ayudar. Evite Motrin, Advil e ibuprofen o aspirina que contiene productos pues éstos aumentarán el riesgo de la sangría. Una adenoidectomía afecta raramente la capacidad de un niño de

comer o de atender a la escuela o al cuidado del día. Cuento con un poco de mala respiración por 1-2 semanas. Los antibióticos orales reducirán a menudo este olor.